



VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

Lista di controllo per la vaccinazione con vaccini a mRNA

✓ Prima della prima vaccinazione

Accertamento amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la forma di assicurazione della persona da vaccinare (AOMS/tessera d'assicurato). • Verificare l'identità della persona da vaccinare
Accertamento dell'indicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccinazione indicata per tutte le persone dall'età di 16 anni (per Moderna Spikevax® da 18 anni) • Vaccinazione per adolescenti 12-15 anni possibile (per il momento solo Comirnaty® raccomandato) • Sulla base dell'attuale raccomandazione di vaccinazione dell'EKIF/UFSP www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute
Accertamento delle controindicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Ipersensibilità nota a componenti del vaccino (in particolare glicole polietilenico [PEG] o macrogol)
Vaccinazione attualmente non raccomandata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per ora non ancora generalmente raccomandata per le donne incinte, ma possibile (vaccinazione dopo rapporto rischi-benefici, vedi sotto le misure precauzionali) 2. Bambini e adolescenti sotto i 12 anni (per Spikevax® sotto i 18 anni)
Accertamento delle misure precauzionali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reazioni di ipersensibilità/allergie note in generale? 2. Immunosoppressione (congenita, acquisita, terapia immunosoppressiva compresi i tumori in trattamento) <ul style="list-style-type: none"> → Indicazione di vaccinazione estensiva del medico specialista curante dopo un'accurata ponderazione del rapporto rischi-benefici e dopo aver informato il paziente 3. Donne incinte (a partire dal 2° trimestre di gravidanza) <ul style="list-style-type: none"> → Indicazione da parte del medico dopo un'accurata ponderazione del rapporto rischi-benefici e un'appropriata informazione nonché previo consenso scritto e documentazione <p>www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute</p>

✓ Prima della seconda vaccinazione

Effetti indesiderati della vaccinazione (EIV) dopo la prima vaccinazione?	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare la documentazione nell'IT-Tool. • Gli EIV inattesi o gravi devono essere segnalati a Swissmedic dal professionista della salute che li ha rilevati. • In caso di reazione anafilattica alla 1ª dose di vaccino non ne deve essere somministrata una 2ª. Vedere anche le spiegazioni nella raccomandazione di vaccinazione: www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute • Lo sviluppo di un «braccio COVID» dopo la prima vaccinazione non è una controindicazione per la somministrazione della seconda dose di vaccino
Dichiarazione degli EIV a Swissmedic	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il link verso il sistema di dichiarazione «EIViS» nell'IT-Tool www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/sorveglianza-del-mercato/farmacovigilanza/elvis.html

✓ Esecuzione della prima / seconda vaccinazione

Stato di salute attuale/ anamnesi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Verificare lo stato di salute generale e decidere: è possibile la vaccinazione oggi? Affezione febbrile acuta? Rimandare la vaccinazione a quando i sintomi saranno scomparsi. Stato dopo un'infezione SARS-CoV-2 confermata (test PCR/antigenico/ IgG anti-spike o anti-nucleocapside)(Gli autotest non contano come prova di infezione passata; Indicazioni e conseguenze di diversi test SARS-CoV-2 (www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute - Test COVID-19) La vaccinazione con una sola dose è raccomandato se avviene almeno 4 settimane dopo l'infezione. La vaccinazione è già possibile dopo che i sintomi sono diminuiti (con 2 dosi se meno di 4 settimane dopo l'infezione). Eccezione: infezione SARS-CoV-2 confermata in persone immunodeficienti: due dosi di vaccino dopo tre mesi In caso di infezione da SARS-CoV-2 dopo la prima vaccinazione: Procedere come per le persone non vaccinate dopo un'infezione confermata da SARS-CoV-2
Informazione del/della cliente	<ul style="list-style-type: none"> La persona da vaccinare ha domande? Ha letto il materiale informativo? Segnalare possibili EIV, in particolare possibili reazioni allergiche e segni di miocardite e pericardite, come dolore al petto, mancanza di respiro o palpitazioni.
Consenso del/della cliente	<ul style="list-style-type: none"> Chiedere alla persona da vaccinare il consenso orale alla vaccinazione sulla base di una decisione informata, nonché il consenso all'inserimento elettronico della vaccinazione nel sistema di inserimento dei dati Per la vaccinazione di una donna incinta è necessario il consenso scritto Nota scritta di consenso alla vaccinazione nel foglio dati di vaccinazione/ IT-Tool Capacità di giudizio: Nel caso di adolescenti dai 12 anni in su che si presentano senza un rappresentante legale, la capacità di giudizio deve essere valutata su base individuale. In caso d'incapacità di discernimento occorre il consenso del rappresentante legale
Compilazione della scheda di dati per la vaccinazione /registrazione nell'IT-Tool	<ul style="list-style-type: none"> Registrare i dati della persona da vaccinare nell'IT-Tool
Preparazione del vaccino	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. foglietto illustrativo del fabbricante: www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.comirnatyeducation.ch/ / www.modernacovid19global.com Possibili procedure per il prelievo di 6 dosi di Comirnaty® Non agitare, capovolgere soltanto più volte, non muovere inutilmente Perforare solo una volta il tappo con l'ago utilizzato per l'aspirazione e muovere questo il meno possibile.
Somministrazione del vaccino	<ul style="list-style-type: none"> Cfr. foglietto illustrativo del fabbricante: www.bbraun.ch/kit-covid19 / www.comirnatyeducation.ch/ / www.modernacovid19global.com i.m. m. deltoide Entrambe le dosi di vaccino con la stessa sostanza, a distanza di 28 giorni (Comirnaty®: almeno 21 giorni) Pazienti anticoagulati: effettuare sempre la vaccinazione i.m., è importante una buona compressione dopo l'iniezione (www.bag.admin.ch/calendariovaccinale)

✓ Dopo la prima / seconda vaccinazione

Spiegazione del comportamento in caso di EIV	<ul style="list-style-type: none"> Segnalare che bisogna notificare gli EIV gravi o inattesi e che il cliente deve rivolgersi al medico/farmacista/centro di vaccinazione Se del caso, dare un numero di contatto
Spiegazione del comportamento in generale dopo la prima/ seconda vaccinazione	<ul style="list-style-type: none"> Continuare a rispettare le regole di comportamento e di igiene. Fatta eccezione per incontri privati tra persone completamente vaccinate (è possibile rinunciare alla maschera ed alle distanze). In caso di necessità di una vaccinazione di richiamo dopo la seconda vaccinazione sarà fornita l'informazione Per le persone gravemente immunodeficienti, una determinazione delle IgG anti-spike è raccomandata 4 settimane dopo la seconda dose per l'indicazione di una possibile terza dose Se compaiono sintomi compatibili con la COVID-19, eseguire il test (vaccinazione non efficace al 100%) Nelle persone completamente vaccinate, si può rinunciare alla quarantena da contatto e di viaggio e alcune altre misure sanitarie di frontiera per un periodo di 12 mesi dopo l'ultima dose (secondo la direttiva cantonale e le informazioni del sito dell'UFSP: Viaggi admin.ch). Eventuali altre vaccinazioni devono essere somministrate a distanza di almeno una settimana
Consegna dell'attestato di vaccinazione	<ul style="list-style-type: none"> Consegnare l'attestato di vaccinazione generato dall'IT-Tool o iscrivere la vaccinazione nel certificato di vaccinazione Se possibile apporre il timbro e la firma della persona che effettua la vaccinazione Incollare/annotare il numero di lotto nell'attestato di vaccinazione Informazioni sul certificato di vaccinazione e rilascio su richiesta: Certificato Covid (admin.ch)
Convocazione al 2. appuntamento (se necessario)	<ul style="list-style-type: none"> Fissare nell'IT-Tool l'appuntamento nello stesso luogo con lo stesso vaccino Eventualmente consegnare un biglietto di appuntamento Consegnare il promemoria che spiega come comportarsi dopo la vaccinazione
Periodo di osservazione dopo la prima/ seconda vaccinazione	<ul style="list-style-type: none"> In caso di reazione allergica devono essere disponibili personale sanitario appositamente formato e un kit di pronto soccorso con adrenalina Sorvegliare in particolare le persone che hanno problemi subito dopo la vaccinazione, p. es. problemi di circolazione Tutte le persone vaccinate devono tratteneresi nel luogo della vaccinazione per almeno 15 minuti dopo averla ricevuta. Se la 1ª dose è stata ben tollerata, dopo la 2ª è sufficiente un'osservazione di 5 minuti.